







FRONTLINE® ComboVet.

Fipronil (S)-methoprene



Dråber der stopper flåter, lus og lopper.

	KAT	FRONTLINE VET 	FRONTLINE VET 	FRONTLINE COMBO VET 
EFFEKT PÅ	MINDSTE ALDER	8 uger	8 uger	8 uger/1 kg
	FLÅTER	Op til 2 uger	Op til 4 uger	Op til 2 uger
	LUS	Direkte virkende	Direkte virkende	Direkte virkende
	LOPPER	Op til 5 uger	Op til 5 uger	Op til 4 uger
	LOPPEÆG & LARVER			Op til 6 uger
PRODUKT INFORMATION	DOSERING	100 ml flaske: 6-12 pumpeslag/kg afhængig af pelsens længde 250 ml flaske: 2-4 pumpeslag/kg afhængig af pelsens længde	1 pipette per behandling	1 pipette per behandling
	AKTIVT STOF	Fipronil	Fipronil	Fipronil & S-metopren

	HUND	FRONTLINE VET 	FRONTLINE VET 	FRONTLINE COMBO VET 
EFFEKT PÅ	MINDSTE ALDER	8 uger	8 uger	8 uger/2 kg
	FLÅTER	Op til 5 uger	Op til 5 uger	Op til 4 uger
	LUS	Direkte virkende	Direkte virkende	Direkte virkende
	LOPPER	Op til 8 uger	Op til 8 uger	Op til 8 uger
	LOPPEÆG & LARVER			Op til 8 uger
PRODUKT INFORMATION	DOSERING	100 ml flaske: 6-12 pumpeslag/kg afhængig af pelsens længde 250 ml flaske: 2-4 pumpeslag/kg afhængig af pelsens længde	1 pipette per behandling	1 pipette per behandling
	AKTIVT STOF	Fipronil	Fipronil	Fipronil & S-methopren

SE ENDVIDERE BRUGSANVISNING PÅ PAKNINGEN

Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og flåter. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fipronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber (S)-methopren. **Indikationer:** Behandling mod angreb af lopper, flåter og bidende lus hos hund og kat samt angreb af lopper og flåter hos ilder. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat og ilder. Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Effekten over for flåter varer i op til 4 uger hos hund og ilder og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. **Kontraindikationer:** Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo, katte under 8 uger og/eller 1 kilo samt ilder yngre end 6 måneder. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat/ilder, da dette kan medføre overdosering. Da der ikke foreligger data herom, anbefales det ikke at anvende præparatet til andre dyr end målarterne. **Administrationsmåde:** Til udvortes brug. **Dosering:** Til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat og ilder: 1 pipette à 0,5 ml. **OBS.** Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat/ilder. Man bør ikke overdosere. **Bivirkninger:** Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme. Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenfiltret/fedt pels). **Forsigtighedsregler:** Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampooade nedsættes virkningsvarigheden. Der foreligger ingen data vedr. mulighed for toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr. Undgå at dyr slikker på behandlingsstedet, og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. Undgå at få produktet i kontakt med mund og øjne. Vask hænderne efter brug. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. **Se endvidere brugsanvisning på pakningen.** Pakninger: **Æske med 3 eller 6 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml.** Udl. V. Januar 2016. **Indehaver af markedstilladelsen i Danmark: Merial Norden A/S. Merial Norden A/S, Box 169, 201 21 Malmø. Tel: 040 606 06 05.**